

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА R-208/16.01.2009

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО!

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ:

ZALAIN® 300 mg pessary

Sertaconazole nitrate

ЗАЛАИН® 300 mg песари

Сертаконазолов нитрат

Състав:

1 песар съдържа:

Сертаконазолов нитрат – 0.3 g

Помощни вещества – 3.0 g

Помощни вещества:

Твърди полусинтетични глицериidi и колоиден силициев диоксид.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА:

Песар – 300 mg

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Фармакологично действие:

ЗАЛАИН е нов локален антимикотик, притежаващ мощно противогъбично действие с широк спектър на действие към патогенните диморфни гъби (*Candida Albicans*, *C.tropicalis*, *C.Spp*, *Pityrosporum orbiculare*), дерматофитите (*Trichophyton*, *Epidermophyton* и *Microsporum*) и други Грам (+) микробы (*Staphylococcus*, *Streptococcus*), причиняващи инфекции в кожата или лигавиците.

Локално лечение на вагинални инфекции причинени от *Candida*.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Известна свръхчувствителност към някой антимикотик от имидазоловата група или към някое от помощните вещества.

Какво трябва да имаме предвид в случай на бременност и кърмене?

Бременност и кърмене

Не се наблюдава ембриотоксичен или тератогенен ефект при изследвания с животни.

Шофиране и работа с машини

Няма специални изисквания.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:

При кандидози: не се препоръчва използването на сапуни с кисело pH (pH благоприятства размножаването на Candidas).

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЗАЛАИН песари:

Винаги използвайте продукта точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.

ДОЗИРОВКА, НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБАТА:

Как и кога би трябвало да използваме ЗАЛАИН песари?

Един вагинален песар се поставя дълбоко във влагалището, за предпочтение в легнало положение. Вагиналният песар може да бъде използван по време на менструация. Един вагинален песар е достатъчен да излекува вагиналната микоза. Но ако симптоматиката персистира, втори вагинален песар може да се постави след 7 дни.

Ако сте пропуснали приложението на ЗАЛАИН песари?

Ако сте пропуснали поставянето на песара, не поставяйте двойно количество.

Ако сте прекъснали или спрете преждевременно използването на ЗАЛАИН песари?

Моля, говорете с Вашия лекар или фармацевт. И в двета случая успешното лечение може да бъде нарушено.

Предозиране

Не приложимо.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Няма данни за взаимодействието на Залаин песари с други лекарства.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Приложението на един вагинален песар не може да доведе до системна абсорбция. Затова появата на нежелани лекарствени реакции след еднократно приложение на Залаин е малко вероятно.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява при температура под 30°C.

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Само по лекарско предписание.

ДАННИ ЗА ОПАКОВКАТА

Кутия с 1 вагинален песар

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Laboratoire THÉRAMEX, 6, av. du Prince Héréditaire Albert – B.P.59 , 98007 Cédex, Монако

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

“Унифарма” ЕООД

ж.к. “Яворов”, бл.10, вх.А, София, България

Тел: 02/884 00 80

Дата на последна редакция: април 2008

