

Листовка за пациентта

ZINNAT™ (Зинат)

Гранули за перорална суспенсия

ИАЛ
ОДОБРЕН
ДАТА 19.12.00

cefuroxime

Тази листовка съдържа информация само за Zinnat суспенсия. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Консултирайте се с вашия лекуващ лекар, ако ви е необходима повече информация или съвет.

Име на лекарството

Zinnat (Зинат)

Какво съдържа вашето лекарство

Zinnat е под формата на гранули за перорална суспенсия. Всеки 5 ml от приготвената суспенсия Zinnat съдържат 125 mg лекарствено вещество cefuroxime (цефуроксим) под формата на cefuroxime axetil (цефуроксим аксетил). Суспенсията съдържа и следните помощни вещества: аспартам, ксантанова гума, калиев ацесулфам, стеаринова киселина, захароза, тути фрути аромат и повидон K30.

Една опаковка Zinnat съдържа бутилка с гранули за приготвяне на суспенсия, мерителна чашка и мерителна лъжиичка от прозрачна пластмаса. Общото количество на суспенсията след приготвяне е 50 ml.

Как действа лекарството

Лекарственото вещество cefuroxime е бактерициден антибиотик (убива бактериите, причиняващи инфекции или техните спори), който принадлежи към групата на цефалоспорините. Вашият лекар е решил да ви лекува с това лекарство, тъй като имате инфекция, причинена от чувствителни на cefuroxime бактерии.

За какво се използва Zinnat

Zinnat суспенсия се прилага за лечение на редица бактериални инфекции:

- Инфекции на горните дихателни пътища (инфекции на носа, ушите и гърлото, като отит, синуит, тонзилит и фарингит).
- Инфекции на долните дихателни пътища (пневмония, остръ бронхит и хроничен бронхит във фаза на обостряне).
- Възпаление на пикочно-половата система: гонорея, пиелонефрит, цистит и уретрит.
- Инфекции на меките тъкани и кожата (фурункулоза, пиодермия и импетиго).
- Лечение на ранни прояви на Лаймска болест и последваща профилактика на късни прояви на заболяването при възрастни и деца над 12 години.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
Zinnat се произвежда от Glaxo Operations UK Ltd., T/A Glaxo Wellcome Operations, Harmire Road, Barnard Castle, Durham DL12 8DT, United Kingdom. Притежател на разрешението за употреба е ГлаксоСмитКлейн ЕООД, ул. Димитър Манов, бл.10, 1408 София, България.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ZINNAT

Ако отговорите с "да" на някой от следните въпроси, съобщете на вашия лекар за това преди да започнете приема на това лекарство.

- Алергични ли сте към cefuroxime, към някоя от другите съставки на Zinnat суспенсия или към пенициилини и други цефалоспорини?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Изследвате ли урината си за захар? Ако го правите, трябва да имате предвид, че Zinnat може да повлияе на резултатите от тези изследвания.
- Приемате ли често таблетки, подпомагащи храносмилането? Те могат да намалят



действието на Zinnat.

- Страдате ли от захарен диабет? Zinnat суспенсия съдържа захар. Една мерителна лъжичка (5 ml) от суспенсията съдържа 3,062 g захароза.
- Известно ли ви е да имате фенилкетонурия? Zinnat суспенсия съдържа аспартам (източник на фенилаланин) и затова трябва да се използва внимателно в случай, че имате фенилкетонурия.

Кажете на вашия лекар ако приемате противозачатъчни лекарства. Както при другите антибиотици може да се наложи да използвате допълнителни контрацептивни средства.

Важно е да уведомите вашия лекар за всички други лекарства, които приемате, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

Как да приемате лекарството

Zinnat суспенсия се приема през устата.

Приемайте лекарството, както лекарят ви е препоръчал.

Обичайната дозировка е:

Възрастни:

- При голяма част от инфекциите - по 250 mg два пъти дневно
- При инфекции на отделителната система - по 125 mg два пъти дневно
- При слабо до по-силно проявени инфекции на долните дихателни пътища, като бронхит - по 250 mg два пъти дневно
- При тежки инфекции на долните дихателни пътища или при съмнение за пневмония - по 500 mg два пъти дневно
- При пиелонефрит - по 250 mg два пъти дневно
- При неусложнена гонорея - 1g в един прием
- При Лаймска болест - по 500 mg два пъти дневно за 20 дни

Деца:

При бебета и деца лекарят предписва доза в зависимост от теглото и възрастта.

- За голяма част от инфекциите при деца на възраст над 3 месеца до 12 години се препоръчва по 125 mg (една мерителна лъжичка) два пъти дневно или по 10 mg лекарствено вещество на един килограм телесна маса два пъти дневно, като дозата не трябва да надвишава 250 mg дневно.
- При деца на възраст над 2 години при отит на средното ухо или при тежки инфекции - по 250 mg (две мерителни лъжички) два пъти дневно или доза от 15 mg/kg два пъти дневно, като дозата не трябва да надвишава 500 mg дневно.
- **Приложението на Zinnat при деца под 3 месеца не се препоръчва, тъй като няма достатъчно данни, доказващи безопасността при тази възрастова група.**

Лечението със Zinnat обикновено трябва да продължи пет дни, но при по-тежки инфекции може да продължи и по-дълго.

Zinnat ще действа по-добре, ако приемате суспенсията по време на хранене.

Не спирайте приема на лекарството преди да завършите целия курс на лечение, дори ако се чувствате по-добре. Възможно е лекарството да не е унищожило всички бактерии и да започне отново влошаване на състоянието ви.

Не приемайте по-големи дози лекарство от предписаните ви от лекаря.

Cefuroxime axetil съществува и под формата на филмирани таблетки.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Указания за приготвяне на Zinnat перорална суспенсия:

1. Разклатете бутилката, за да се размесят гранулите. Отстранете капачката и покривната мембрана. При липса или нарушен цялост на мембрата, върнете лекарството в аптеката.
2. Напълнете мерителната чашка с вода до маркировката. Прибавете цялото измерено количество вода в бутилката и затворете плътно капачката.
3. Обърнете бутилката с капачката надолу и разклатете силно (най-малко за 15 секунди).



4. Обърнете бутилката в нормално положение и отново силно разклатете.
5. Поставете веднага в хладилник при температура 2-8°C.

Указания за употреба на суспенсията след пригответяне:

Бутилката с пригответена суспенсия трябва да се разклаща силно преди всеки прием! Преди прием използвайте мерителната лъжичка, поставена в опаковката, за да измерите предписаната доза. Напълнената дроге лъжичка съдържа 5 ml суспенсия, което е равно на 125 mg лекарствено вещество. Пригответена суспенсия не трябва да се смесва с топли напитки. Вече измерената доза суспенсия може да бъде прибавена към охладени плодови сокове или мляко точно преди приема. Пригответена суспенсия трябва да се съхранява винаги в хладилник при температура 2-8°C и да се използва най-много до 10 дни.

Какво да направите в случай, че сте приели по-голяма доза от предписаната

Ако случайно сте приели прекалено висока доза, може да се почувствате зле. Уведомете вашия лекар, колкото е възможно по-скоро.

Какво да направите в случай, че пропуснете някоя доза

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се беспокойте. Приемете дозата веднага, след като си спомните и продължете да приемате следващите дози точно според определеното време.

Шофиране и работа с машини

Тъй като Zinnat може да причини световъртеж, бъдете предпазливи при шофиране или работа с машини.

СЛЕД ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО

Нежелани лекарствени реакции

Повечето пациенти, които приемат това лекарство, не се оплакват от поява на нежелани лекарствени реакции. Както всяко лекарство, Zinnat може да предизвика нежелани реакции при някои хора.

Ако се наложи да ви бъдат направени някакви кръвни изследвания, напомнете на лекаря, че приемате Zinnat. Това е наложително, тъй като антибиотиците могат да повлият на резултатите от кръвните изследвания.

Ако се появи някой от следните симптоми не спирайте приема на лекарството, но уведомете вашия лекар:

- сърбеж, избледняване на кожата или екзема,
- главоболие,
- гадене и повръщане или лекостепенна диария,
- по-лесна от обикновеното поява на синими от удар или натъртане.

Ако се появи някой от следните симптоми, спрете приема на лекарството и уведомете вашия лекар, колкото е възможно по-скоро:

- поява на силно гадене, повръщане, диария или силни болки в стомаха,
- поява на кървене от правото черво (при ходене по голяма нужда),
- жълто оцветяване на кожата или склерите на очите.

Някои хора са алергични към лекарства. Ако при вас се появи някой от следните симптоми скоро след приема на Zinnat, спрете приложението му и уведомете лекуващия лекар НЕЗАБАВНО:

- внезапно затруднение в дишането с хрипове или стягане в гръденния кош,
- подуване на клепачите, лицето или устните,
- кожен обрив или уртици където и да е по тялото.

При лечение на Лаймска болест антибиотичната терапия води до краткотрайна реакция, включваща умора, студени тръпки и втрисане, появяващи се два до четири часа след приема на антибиотика.

Посъветвайте се с вашия лекар, в случай че развиете някакви други симптоми, които не са



описани в тази листовка.

Как се съхранява лекарството

Преди пригответяне, суспенсията се съхранява при температура под 30°C, далече от пряка слънчева светлина или топлина.

След пригответяне суспенсията трябва да се съхранява винаги в хладилник при температура от 2 до 8°C.

Не използвайте суспенсия, приготвена преди повече от 10 дни.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

ЗАПОМНЕТЕ!

Това лекарство е предписано лично на вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като вашите.

Тази листовка не съдържа цялата информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към лекар. Може да се наложи да прочетете листовката отново, затова не я изхвърляйте, докато приемате лекарството.

Zinnat (Зинат) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies

Дата на последната редакция на листовката: Октомври 2006 г.

