

Листовка за пациента

ZINNAT™ (Зинат)

250 mg/5 ml

Гранули за перорална суспензия

цефуроксим (cefuroxime)

АЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВОВА Д	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 2968	16.09.08
Одобрено: 19/17.06.08	

Тази листовка съдържа информация само за Zinnat суспензия. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Консултирайте се с Вашия лекар, ако Ви е необходима повече информация или съвет.

Име на лекарството

Zinnat (Зинат)

Какво представлява и какво съдържа лекарството

Zinnat е под формата на гранули за перорална суспензия. Всеки 5 ml от приготвената суспензия Zinnat съдържат 250 mg от активното вещество цефуроксим (cefuroxime) под формата на цефуроксим аксетил (cefuroxime axetil). Суспензията съдържа също така и следните помощни вещества: аспартам, ксантанова гума, ацесулфам калий, стеаринова киселина, захароза, вкус на плодове и повидон К30.

Една опаковка Zinnat съдържа бутилка с гранули за приготвяне на суспензия, мерителна чашка и мерителна лъжичка от прозрачна пластмаса. Общото количество на суспензията след приготвяне е 50 ml или 100 ml.

Как действа лекарството

Активното вещество цефуроксим е бактерициден антибиотик (убива бактериите, причиняващи инфекции или техните спори), който принадлежи към групата на цефалоспорините. Вашият лекар е решил да Ви лекува с това лекарство, тъй като имате инфекция, причинена от чувствителни на цефуроксим бактерии.

За какво се използва Zinnat

Zinnat суспензия се прилага за лечение на редица бактериални инфекции:

- Инфекции на горните дихателни пътища (инфекции на носа, ушите и гърлото, като отит, синусит, тонзилит и фарингит).
- Инфекции на долните дихателни пътища (пневмония, остър бронхит и хроничен бронхит във фаза на обостряне).
- Възпаление на пикочо-половата система: гонорея, пиелонефрит, цистит и уретрит.
- Инфекции на меките тъкани и кожата (фурункулоза, пиодермия и импетиго).
- Лечение на ранни прояви на Лаймска болест и последваща профилактика на късни прояви на заболяването при възрастни и деца над 12 години.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България

Zinnat се произвежда от Glaxo Operations UK Ltd., Harmire Road, Barnard Castle, Durham, Великобритания. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Великобритания, представяван в България от ГлаксоСмитКлайн ЕООД, с адрес: София 1408, ул. Димитър Манов, бл.10.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ZINNAT

Ако отговорите с "да" на някои от следните въпроси, съобщете на Вашия лекар за това преди да започнете приема на това лекарство.

- Алергични ли сте към цефуроксим, към някоя от другите съставки на Zinnat суспензия или към пеницилини и други цефалоспорини?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Изследвате ли урината си за захар? Ако го правите, трябва да имате предвид, че Zinnat може да повлияе на резултатите от тези изследвания.
- Приемате ли често таблетки, подпомагащи храносмилането? Те могат да намалят



Листовка за пациента

действието на Zinnat.

- Страдате ли от захарен диабет? Zinnat суспензия съдържа захар. Една мерителна лъжичка (5 ml) от суспензията съдържа 2,289 g захароза.
- Известно ли Ви е да имате фенилкетонурия? Zinnat суспензия съдържа аспартам (източник на фенилаланин) и затова трябва да се използва внимателно в случай, че имате фенилкетонурия.

Кажете на Вашия лекар ако приемате противозачатъчни лекарства. Както при други антибиотици може да се наложи да използвате допълнителни контрацептивни средства.

Важно е да уведомите Вашия лекар за всички други лекарства, които приемате, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

Как да приемате лекарството

Zinnat суспензия се приема през устата.

Приемайте лекарството, както лекарят Ви е препоръчал.

Обичайната дозировка е:

Възрастни:

- При голяма част от инфекциите - по 250 mg два пъти дневно
- При инфекции на отделителната система - по 125 mg два пъти дневно
- При слабо до по-силно проявени инфекции на долните дихателни пътища, като бронхит - по 250 mg два пъти дневно
- При тежки инфекции на долните дихателни пътища или при съмнение за пневмония - по 500 mg два пъти дневно
- При пиелонефрит - по 250 mg два пъти дневно
- При неусложнена гонорея - 1g в един прием
- При Лаймска болест - по 500 mg два пъти дневно за 20 дни

Деца:

При бебета и деца лекарят предписва доза в зависимост от теглото и възрастта.

- За голяма част от инфекциите при деца на възраст над 3 месеца до 12 години се препоръчва по 125 mg два пъти дневно или по 10 mg цефутоксим на един килограм телесна маса два пъти дневно, като дозата не трябва да надвишава 250 mg дневно.
- При деца на възраст над 2 години при отит на средното ухо или при тежки инфекции - по 250 mg два пъти дневно или доза от 15 mg/kg два пъти дневно, като дозата не трябва да надвишава 500 mg дневно.
- **Приложението на Zinnat при деца под 3 месеца не се препоръчва, тъй като няма достатъчно данни, доказващи безопасността при тази възрастова група.**

Лечението със Zinnat обикновено трябва да продължи пет дни, но при по-тежки инфекции може да продължи и по-дълго.

Zinnat ще действа по-добре, ако приемате суспензията по време на хранене.

Не спирайте приема на лекарството преди да завършите целия курс на лечение, дори ако се чувствате по-добре. Възможно е лекарството да не е унищожило всички бактерии и да започне отново влошаване на състоянието Ви.

Не приемайте по-големи дози лекарство от предписаните Ви от лекаря.

Цефутоксим аксетил съществува и под формата на филмирани таблетки.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Указания за приготвяне на Zinnat перорална суспензия:

1. Разклатете бутилката, за да се размесят гранулите. Отстранете капачката и покривната мембрана. При липса или нарушена цялост на мембраната, върнете лекарството в аптеката.
2. Напълнете мерителната чашка с вода до линията. Прибавете цялото измерено количество вода в бутилката и затворете плътно капачката.
3. Обърнете бутилката с капачката надолу и разклатете силно (най-малко 15 секунди).
4. Обърнете бутилката в нормално положение и отново силно разклатете.



Листовка за пациента

5. Поставете веднага в хладилник при температура 2-8°C.

Указания за употреба на суспензията след приготвяне:

Бутилката с приготвената суспензия трябва да се разклаща силно преди всеки прием.

Преди прием използвайте мерителната лъжичка, поставена в опаковката, за да измерите предписаната доза. Напълнената догоре лъжичка съдържа 5 ml суспензия, което е равно на 250 mg активно вещество. Приготвената суспензия не трябва да се смесва с топли напитки. Измерената доза суспензия може да бъде прибавена към охладени плодови сокове или мляко точно преди приема.

Приготвената суспензия трябва да се съхранява винаги в хладилник при температура 2-8°C и да се използва най-много до 10 дни.

Какво да направите в случай, че сте приели по-голяма доза от предписаната

Ако случайно сте приели прекалено висока доза, може да се почувствате зле. Уведомете Вашия лекар, колкото е възможно по-скоро.

Какво да направите в случай, че пропуснете някоя доза

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се безпокойте. Приемете дозата веднага, след като си спомните и продължете да приемате следващите дози точно според определеното време.

Шофиране и работа с машини

Тъй като Zinnat може да причини световъртеж, бъдете предпазливи при шофиране или работа с машини.

СЛЕД ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО

Нежелани лекарствени реакции

Повечето пациенти, които приемат това лекарство, не се оплакват от поява на нежелани лекарствени реакции. Както всяко лекарство, Zinnat може да предизвика нежелани реакции при някои хора.

Ако се наложи да Ви бъдат направени някакви кръвни изследвания, напомнете на лекаря, че приемате Zinnat. Това е наложително, тъй като антибиотиците могат да повлияят на резултатите от кръвните изследвания.

Ако се появи някой от следните симптоми не спирайте приема на лекарството, но уведомете Вашия лекар:

- сърбеж, изbledняване на кожата или екзема,
- главоболие,
- гадене и повръщане или лекостепенна диария,
- по-лесна от обикновеното поява на синини от удар или натъртване.

Ако се появи някой от следните симптоми, спрете приема на лекарството и уведомете Вашия лекар, колкото е възможно по-скоро:

- поява на силно гадене, повръщане, диария или силни болки в стомаха,
- поява на кръвене от правото черво (при ходене по голяма нужда),
- жълто оцветяване на кожата или склерите на очите.

Някои хора са алергични към лекарства. Ако при Вас се появи някой от следните симптоми скоро след приема на Zinnat, спрете приложението му и уведомете Вашия лекар или потърсете лекарска помощ НЕЗАБАВНО:

- внезапно затруднение в дишането с хрипове или стягане в гърдния кош,
- подуване на клепачите, лицето или устните,
- кожен обрив или уртики, където и да е по тялото.

При лечение на Лаймска болест антибиотичната терапия води до краткотрайна реакция, включваща умора, студени тръпки и втрисане, появяваща се два до четири часа след



Листовка за пациента

приема на антибиотика.

Посъветвайте се с Вашия лекар, в случай че развиете някакви други симптоми, които не са описани в тази листовка.

Как се съхранява лекарството

Преди приготвяне, суспензията се съхранява при температура под 30°C, далече от пряка слънчева светлина или топлина.

След приготвяне, суспензията трябва да се съхранява винаги в хладилник при температура от 2°C до 8°C.

Не използвайте суспензия, приготвена преди повече от 10 дни.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

ЗАПОМНЕТЕ!

Това лекарство е предписано лично на Вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Този листовка не съдържа цялата информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар. Може да се наложи да прочетете листовката отново, затова не я изхвърляйте, докато приемате лекарството.

Zinnat (Зинат) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

Дата на последната редакция на листовката:

(GDS №22)

