

Листовка за пациента

ZINNAT™

ЗИНАТ™

Филмирани таблетки

ИАЛ

ОДОБРЕННО!
ДАТА 10.12.06

Cefuroxime

Тази листовка съдържа информация само за Zinnat таблетки. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Консултирайте се с вашия лекуващ лекар, ако ви е необходима повече информация или съвет.

Име на лекарството

Zinnat (Зинат)

Какво съдържа вашето лекарство

Zinnat е под формата на филмирани таблетки.

Всяка таблетка Zinnat съдържа 250 mg или 500 mg лекарствено вещество cefuroxime (цефуроксим) под формата на cefuroxime axetil (цефуроксим аксетил). Таблетките съдържат също така и следните помощни вещества: микрокристална целулоза, натриева кроскармелоза, натриев лаурилсулфат, хидрогенирано растително масло, колоиден силициев диоксид, пропиленгликол, метилхидроксипропилцелулоза, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат и бял оцветител.

Таблетките са опаковани в блистер и картонена кутия. Всяка опаковка съдържа 10 таблетки.

Как действа лекарството

Лекарственото вещество cefuroxime е бактерициден антибиотик (убива бактериите, причиняващи инфекции или техните спори), който принадлежи към групата на цефалоспорините. Вашият лекар е решил да ви лекува с това лекарство, тъй като имате инфекция, причинена от чувствителни на cefuroxime бактерии.

За какво се използва Zinnat

Zinnat таблетки се прилага за лечение на редица бактериални инфекции:

- Инфекции на горните дихателни пътища (инфекции на носа, ушите и гърлото, като отит, синуит, тонзилит и фарингит).
- Инфекции на долните дихателни пътища (пневмония, остръ бронхит и хроничен бронхит във фаза на обостряне).
- Възпаление на пикочно-половата система: гонорея, пиелонефрит, цистит и уретрит.
- Инфекции на меките тъкани и кожата (фурункулоза, пиодермия и импетиго).
- Лечение на ранни прояви на Лаймска болест и последваща профилактика на късни прояви на заболяването при възрастни и деца над 12 години.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
Zinnat таблетки се произвежда от Glaxo Operations UK Ltd, T/A Glaxo Operations, Harmire Road, Barnard Castle, Durham DL12 8DT, United Kingdom или GlaxoSmithKline S.p.A., Via Alessandro Fleming, 37135 Verona, Italy. Притежател на разрешението за употреба е ГлаксоСмитКлейн ЕООД, ул. Димитър Манов, бл.10, 1408 София, България.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ZINNAT

Ако отговорите с "да" на някой от следните въпроси, съобщете на вашия лекар за това преди да започнете приема на това лекарство.

- Алергични ли сте към cefuroxime, към някоя от другите съставки на Zinnat таблетки или към пеницилини и други цефалоспорини?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Изследвате ли урината си за захар? Ако го правите, трябва да имате предвид, че Zinnat може да повлияе на резултатите от тези изследвания.
- Приемате ли често таблетки, подпомагащи храносмилането? Те могат да намалят



Листовка за пациента

действието на Zinnat.

Кажете на вашия лекар ако приемате противозачатъчни лекарства. Както при другите антибиотици може да се наложи да използвате допълнителни контрацептивни средства.

Важно е да уведомите вашия лекар за всички други лекарства, които приемате, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

КАК СЕ ПРИЕМА ZINNAT

Zinnat таблетки се приемат през устата.

Приемайте лекарството, както лекарят ви е препоръчал.

Обичайната дозировка е:

Възрастни:

- при голяма част от инфекциите - по 250 mg два пъти дневно
- при инфекции на отделителната система - по 125 mg два пъти дневно
- при слабо до по-силно проявени инфекции на долните дихателни пътища, като бронхит - по 250 mg два пъти дневно
- при тежки инфекции на долните дихателни пътища или при съмнение за пневмония - по 500 mg два пъти дневно
- при пиелонефрит – по 250 mg два пъти дневно
- при неусложнена гонорея - 1g в един прием
- при Лаймска болест - по 500 mg два пъти дневно за 20 дни

Деца:

- за голяма част от инфекциите - по 125 mg два пъти дневно, като дозата не трябва да надвишава 250 mg за 24 часа.
- при деца на възраст над 2 години при отит на средното ухо или в зависимост от състоянието при тежки инфекции - по 250 mg два пъти дневно, като дозата не трябва да надвишава 500 mg за 24 часа.

Лечението със Zinnat обикновено трябва да продължи пет дни, но при по-тежки инфекции може да продължи и по-дълго.

Не спирайте приема на лекарството преди да завършите целия курс на лечение, дори ако се чувствате по-добре. Възможно е лекарството да не е унищожило всички бактерии и да започне отново влошаване на състоянието ви.

При необходимост таблетките може да се прогълъщат с вода, като ще действат по-добре, ако ги приемате след хранене.

Целостта на таблетките не трябва да се нарушава. Ако детето ви не може да прогълъща таблетките, не ги чупете. Поискайте от лекаря да замени таблетките със Zinnat суспенсия.

Не приемайте повече таблетки от предписаните ви от вашия лекар.

Какво да направите в случай, че сте приели по-голям от предписания ви брой таблетки

Ако случайно сте приели прекалено висока доза, може да се почувстввате зле. Уведомете вашия лекар, колкото е възможно по-скоро.

Какво да направите в случай, че пропуснете някоя доза

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се беспокойте. Приемете дозата веднага, след като си спомните и продължете да приемате следващите дози точно според определеното време.

Шофиране и работа с машини

Тъй като Zinnat може да причини световъртеж, бъдете предпазливи при шофиране или работа с машини.



Листовка за пациента

СЛЕД ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО

Нежелани лекарствени реакции

Повечето пациенти, които приемат това лекарство, не се оплакват от поява на нежелани лекарствени реакции. Както всяко лекарство, Zinnat таблетки може да предизвика нежелани реакции при някои лица.

Ако се наложи да ви бъдат направени някакви кръвни изследвания, напомнете на лекаря, че приемате Zinnat. Това е наложително, тъй като антибиотиците могат да повлият на резултатите от кръвните изследвания.

Ако се появи някой от следните симптоми не спирайте приема на лекарството, но уведомете вашия лекар:

- сърбеж, избледняване на кожата или екзема,
- главоболие,
- гадене и повръщане или лекостепенна диария,
- по-лесна от обикновеното поява на синини от удар и натъртане.

Ако се появи някой от следните симптоми, спрете приема на лекарството и уведомете вашия лекар, колкото е възможно по-скоро:

- поява на силно гадене, повръщане, диария, или силни болки в стомаха,
- поява на кървене от правото черво (при ходене по голяма нужда),
- жълто оцветяване на кожата или склерите на очите.

Някои хора са алергични към лекарства. Ако при вас се появи някой от следните симптоми скоро след приема на Zinnat, спрете приложението му и уведомете лекуващия лекар **НЕЗАБАВНО**:

- внезапно затруднение в дишането с хрипове или стягане в гръденния кош,
- подуване на клепачите, лицето или устните,
- кожен обрив или уртици където и да е по тялото.

При лечение на Лаймска болест антибиотичната терапия води до краткотрайна реакция, включваща умора, студени тръпки и втрисане, появяващи се два до четири часа след приема на антибиотика.

Посъветвайте се с вашия лекар в случай че развиете някакви други симптоми, които не са описани в тази листовка.

Как се съхранява лекарството

Съхранявайте таблетките при стайна температура до 30°C, далече от пряка слънчева светлина или топлина.

Съхранявайте таблетките на място, недостъпно за деца.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

ЗАПОМНЕТЕ!

Това лекарство е предписано лично на вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като вашите.

Тази листовка не съдържа цялата информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към лекар. Може да се наложи да прочетете листовката отново, затова не я изхвърляйте, докато приемате лекарството.

Zinnat (Зинат) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

Дата на последната редакция на листовката: Октомври 2006 г.

