

Информация за пациента

БЕТАДИНЕ® (BETADINE®)

унгвент

Производител: EGIS Pharmaceuticals Ltd.
1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38
Hungary
Phone: (36-1) 265-5555
Fax: (36-1) 265-5529

1. Какво съдържа Вашето лекарство?

Всяка туба съдържа 100 мг от активното вещество Povidone-iodine в 1 г хидрофилен унгвент.

Съдържа също: sodium hydrogen carbonate, polyethylene glycol, purified water.

Бетадине® унгвент е средство с антисептично действие, което има широк спектър на антимикробна активност срещу бактерии, вируси, гъбички и протозои.

Използва се за лечение на изгаряния, порезни и контузни рани, трофични язви (улкус крурис, декубитус), кожни инфекции и реинфектирани дерматози.

При необходимост се нанася като тънък слой върху засегнатата кожна област няколко пъти дневно.

2. Кога НЕ трябва да употребявате Бетадине® унгвент?

Вие не трябва да използвате Бетадине® унгвент, ако:

- сте имали алергична реакция към йод или към някоя от съставките на препарата;
- сте в състояние със свръхактивност на щитовидната жлеза;
- имате кожно възпаление;
- сте на лечение с радиоактивен йод;
- сте бременна или кърмите.

3. Предпазни мерки преди употреба на Бетадине® унгвент

Избягвайте употребата на препарата при новородени и кърмачета. Винаги следвайте съветите на лекаря за употребата на унгвента.

4. Предпазни мерки по време на употреба на Бетадине® унгвент

Съобщете на Вашия лекар, ако се появи каквато и да било кожна реакция след употребата на Бетадине® унгвент.

5. **Как други лекарства могат да повлияят Вашето лечение с Бетадине® ?**
Бетадине® унгвент не може да се използва заедно с дезинфектанти, които съдържат живак, или с бензоена тинктура.
6. **Шофиране и работа с машини по време на лечение с Бетадине®**
Няма ограничения.
7. **Как да се прилага унгвента**
Почистете засегнатата кожна област и я подсушете. Нанесете тънък слой от унгвента върху засегнатата кожна област няколко пъти дневно. Бетадине® унгвент може да се използва толкова често, колкото е необходимо.
- Предозиране**
Прилага се върху кожата като антисептичен препарат. (Резорбция на унгвента през кожата практически не се установява).
Важно е унгвентът да не се яде, да не се гълта и да не се употребява в областта в или близо до устата.
8. **Възможно е да изпитате нежелани ефекти**
В случай на чувствителност към йод може да се появи раздразнение, което е рядко и преходно.
- Ако се появят някои други нежелани ефекти,
Вие трябва да съобщите на лекуващия лекар!***
- Срокът на годност е отпечатан върху картонената опаковка.
Не трябва да употребявате унгвента след тази дата!
Съхранявайте унгвента на сигурно, недостъпно за деца място!
- Вие трябва да съхранявате унгвента при температура под 20°C, на сухо място.
Съхранявайте го в оригиналната опаковка. Не го слагайте в друга опаковка.
9. **Дата на изготвяне или последна проверка**
Февруари 1998