


Листовка за пациента

BETNESOL™

БЕТНЕЗОЛ

Капки за очи, уши и нос, разтвор

ПРОИЗВЕЖДАТЕЛ: Глаксо Уелълком ЮА (П) ЛТД., 11 Олд Претория Роуд, Халфвей Хаус, Мидранд - Гаутенг, Република Южна Африка	
Препоръчително към: ГЛАКСО УЕЛЪЛКОМ ЮА (П) ЛТД.	
616/18.12.01	

Тази листовка се отнася само за Betnesol под формата на капки за очи, уши и нос, разтвор. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете употреба на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно Betnesol. За повече информация или съвет се обърнете към лекар или фармацевт.

Наименование на лекарството:

Името на лекарството е Betnesol.

Какво представлява и какво съдържа Betnesol

Betnesol се предлага в картонени кутии, съдържащи флакони с 5 ml капки за очи, уши и нос, разтвор.

Betnesol под формата на капки за очи, уши и нос представлява стерилен, стабилизиран разтвор на бетаметазон натриев фосфат 0,1 % w/v.

Всеки един милилитър (1 ml) под формата на капки за очи, уши и нос съдържа:
лекарствено вещество: бетаметазон натриев фосфат 0,1 % w/v.

Лекарството съдържа и следните помощни вещества: разтвор на бензалкониев хлорид, динатриев хидроген хлорид, натриев хлорид, динатриев едетат, натриев хидроксид или фосфорна киселина за корекция на киселинността до рН 8,0 и пречистена вода.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за продажбата му в България

Betnesol се произвежда от GlaxoWellcome South Africa (Pty) Ltd., 11 Old Pretoria Road, Halfway House, Midrand - Gauteng, Republic of South Africa. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от GlaxoWellcome Export Ltd. с адрес: София, кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов бл.10.

Как действа лекарството

Бетаметазон е от групата лекарства, наречени кортикостероиди. Кортикостероидите се употребяват за лечение на неинфекциозни възпалителни заболявания, тъй като притежават противовъзпалително действие. Неинфекциозни заболявания са тези, които не са причинени от вируси, бактерии или гъбички.

За какво се използва Betnesol

Този лекарствен продукт се използва за лечение на неинфекциозни възпалителни заболявания на очите, ушите или носа, повлияващи се от кортикостероидна терапия.

Прилага се при следните заболявания на очите:

- Увеит (възпаление на пигментираната част на окото)
- Маргинален кератит (възпаление на ръба на роговицата)
- Алергичен конюнктивит
- Блефарит (възпаление на клепачите)
- Еписклерит (възпаление на една от обвивките на окото)

Преди да започнете приложение на лекарството:

Преди приложение проверете дали употребата на Betnesol е правилна във Вашия случай и дали Betnesol е лекарство, подходящо за Вас.

Листовка за пациента

Ако отговорите с “ да ” на някой от следните въпроси, уведомете лекаря за това преди да започнете да прилагате лекарството:

- Имали ли сте прояви на алергия (повишена чувствителност) към бетаметазон или към някоя от съставките на лекарствения продукт
- Бременна ли сте / планирате ли скорошна бременност
- Кърмите ли
- Страдате ли от вирусни, бактериални, гъбични инфекции, имате ли гнойни заболявания
- Боледувате ли от туберкулоза

Това лекарство не трябва да се прилага при глаукома (повишено вътреочно налягане) или съмнение за херпетичен кератит (т.е. язвичка на окото, причинена от херпесна инфекция). В някои случаи приложението на кортикостероиди с локално (местно) действие при херпетичен кератит може да доведе до увеличаване размерите на язвичката и забележимо влошаване на зрението.

При зачервяване на очите, не се препоръчва приложение на кортикостероиди без лекарско предписание. Лечението с кортикостероиди не трябва да се повтаря или да продължава без редовни прегледи за изключване повишаване на вътреочното налягане или неподозирани инфекции.

Приложението на Betnesol в ухото е противопоказано при спукване на тъпанчевата мембрана. Трябва да имате предвид, че локалното приложение на кортикостероиди, включително на Betnesol, в по-високи от препоръчаните дози, или за продължително време, може да доведе до нежелани реакции, засягащи целия организъм (напр. повишаване на кръвното налягане, повишаване на кръвната захар, лунообразно лице, подтискане на растежа и развитието при децата).

Употребата на Betnesol при деца трябва да бъде ограничена до минималното количество, необходимо за постигане на лечебен ефект и само съгласно препоръките на лекуващия лекар.

Очните капки Betnesol съдържат като консервант бензалкониев хлорид. **Да не се използват за лечение при пациенти, използващи меки контактни лещи.**

Непременно уведомете лекаря за всички лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами, без лекарско предписание или препоръка.

По време на бременност и кърмене лекарството може да се прилага само, ако очакваната полза от лечението на майката превъзхожда всеки риск за детето.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за повлияване способността за шофиране и работата с машини при лечение с Betnesol под формата на капки за очи, уши и нос, разтвор.

Как да прилагате Betnesol

Прилагайте Вашето лекарство, както лекарят Ви е препоръчал. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението.

Важно е лекарството да бъде прилагано точно в определеното време.

Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка на Betnesol капки е:

За очи: По 1 или 2 капки в засегнатото око през един-два часа, докато почувствате подобрене, след което честотата на приложение може да се намали.

За уши: По 2 или 3 капки в засегнатото ухо през два-три часа, докато усетите подобрене, след което честотата на приложение може да се намали.

За нос: По 2 или 3 капки във всяка ноздра два или три пъти дневно.

Ако не сте сигурни как да прилагате лекарството попитайте лекуващия си лекар.

Листовка за пациента

Какво да направите в случай, че приложите повече от необходимото

Малко вероятно е случайното прилагане на твърде голяма доза от лекарството да Ви създаде сериозни проблеми. Ако това се случи, потърсете съвета на лекар.

Какво да направите в случай, че пропуснете да приложите лекарството

Ако сте забравили да приложите някоя доза, не се безпокойте. Приложете дозата веднага, след като си спомните и продължете да прилагате следващите дози точно според определеното време. Ако обаче е приближило времето за следващата доза, изчакайте и приложете направо следващата доза. Не прилагайте двойна доза.

Причинява ли Betnesol нежелани реакции

След приложението му Betnesol, подобно на всяко друго лекарство, може да причини нежелани лекарствени реакции.

Понякога капките за очи, съдържащи кортикостероиди, могат да причинят сериозно повишаване на вътреочното налягане (най-често когато Ваш кръвен роднина боледува от глаукома, тоест Вие имате семейно предразположение към това заболяване), както и при продължително приложение на лекарствения продукт.

Много рядко може да възникне изтъняване на обвивката на очната ябълка, което да доведе до нейната перфорация.

Съобщава се за поява на катаракта (перде на окото) в резултат на ненужно удължаване на кортикостероидната терапия при очни заболявания.

Прекомерно и продължително приложение в носа на по-високи от препоръчаните дози може да доведе до нежелани реакции, засягащи целия организъм.

При по-продължително приложение в носа Betnesol може да предизвика локални симптоми като сухота, парене, леко кървене или кръвоизлив от носа. Много рядко е съобщавано за перфорация на носната преграда при локална употреба на глюкокортикостероиди.

Ако малко след приложение на Betnesol се появи някой от гореизброените симптоми, СПРЕТЕ употребата на лекарството и уведомете незабавно лекуващия лекар.

Как се съхранява лекарството

Съхранявайте Betnesol, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте лекарството на сухо място, при температура под 25⁰С.

Не прилагайте капките един месец след първото отваряне.

Да не се използва след датата на изтичане на срока за годност, посочена върху опаковката.

ЗАПОМНЕТЕ!

Това лекарство е за Вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на Вашите.

Тази листовка не Ви дава пълна информация за лекарството.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Може да Ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте, докато не употребите лекарството в опаковката.

□□□□