

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-3211, 21.10.08
Одобрено: 22/16.09.08

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЕВИТ ФОРТЕ

100 mg/200 mg/200 микрограма

Филмирани таблетки

Тиаминов хидрохлорид (Витамин В₁) / Пиридоксинов хидрохлорид (Витамин В₆) / Цианокобаламин (Витамин В₁₂)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

- 1) Какво представлява Бевит Форте и за какво се използва
- 2) Преди да използвате Бевит Форте
- 3) Как да приемате Бевит Форте
- 4) Възможни нежелани реакции
- 5) Как да съхранявате Бевит Форте
- 6) Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕВИТ ФОРТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Тиаминовият хидрохлорид (Витамин В₁) подпомага метаболизма на въглехидратите. Тиамин се открива в нервната тъкан и в клетъчните мембрани и участва в синтеза на медиатори на невронната функция.

Пиридоксиновият хидрохлорид (Витамин В₆) участва в метаболизма на аминокиселините в нервната тъкан. В допълнение Витамин В₆ повлиява биосинтезата на много добре познати медиатори като допамин, адреналин и норадреналин.



Цианокобаламинът (Витамин В₁₂) повлиява метаболизма на специалните клетъчни компоненти (нуклеинови киселини) и особено метаболизма на мастните киселини, които играят голяма роля в нервната тъкан. Този витамин е незаменим (есенциален) за растежа и размножаването на клетките.

Бевит Форте подпомага лечението на невропатиите при следните състояния:

- възпалителни и дегенеративни невропатии от различен произход;
- неврити и невралгии;
- неврит на нервните коренчета в резултат от заболявания на костите на гърба;
- болка и ограничени движения на врата, раменния пояс и ръцете, дължащи се на възпаление на шийния нервен плексус;
- болка и ограничени движения на поясния отдел на гръбначния стълб;
- болка на седалищния нерв;
- тригеминална невралгия;
- синдром рамо-ръка;
- интеркостална невралгия;
- парализа на лицевите мускули.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ БЕВИТ ФОРТЕ

Не приемайте Бевит Форте ако сте алергични към активните вещества, или към някоя от останалите съставки на лекарствения продукт.

Обърнете специално внимание при употребата на Бевит Форте

Информирайте Вашия лекар, или фармацевт незабавно в случаи на поява на нежелани реакции, или бременност по време на приемането на продукта. Употребата му във високи дози повече от четири седмици трябва да се избягва.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар, или фармацевт ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Едновременната употреба на Бевит Форте с Л-Допа може да отслаби ефекта на Витамин В₆.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар, или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Употребата на Бевит Форте по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

Употребата на Бевит Форте не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.



3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ БЕВИТ ФОРТЕ

Винаги приемайте Бевит Форте точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар, или фармацевт.

Ако не е предписано друго, приемайте Бевит Форте 3 пъти на ден. Таблетките се приемат през устата цели, с малко количество течност след хранене.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Бевит Форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1000$) - неспецифични нежелани реакции като гадене, главоболие и световъртеж.

Много редки ($< 1/10\ 000$) - реакции на свръхчувствителност от приложението на витамин В₁ или В₁₂, които се проявяват най-вече като кожни реакции.

Реакциите на свръхчувствителност се наблюдават при продължително и неправилно приемане на много високи дози витамин В₆.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар, или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БЕВИТ ФОРТЕ

Съхранявайте в оригиналната опаковка при температура под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията, или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Бевит Форте

Активните вещества са: Тиаминов хидрохлорид (Витамин В₁)
Пиридоксинов хидрохлорид (Витамин В₆)
Цианокобаламин (Витамин В₁₂)

Другите съставки са:

Сърцевина на таблетката: микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, повидон

Филмово покритие: макрогол 6000, титанов диоксид, талк, хипромелоза, поли-(етилакрилметилметакрилат) дисперсия 30%.

Как изглежда Бевит Форте и какво съдържа опаковката

Опаковките съдържат 20, или 100 филмирани таблетки.



Притежател на разрешението за употреба и производител

Gerot Pharmazeutika
Arnethgasse 3
A-1160, Vienna
Австрия

Дата на последно одобрение на листовката
Юли 2008

