



Прочетете внимателно листовката, преди да започнете да използвате този лекарствен продукт, защото тя съдържа важна за Вас информация.


Този лекарствен продукт се предлага без лекарско предписание за лечение на по-леки заболявания, които не изискват лекарска помощ. Въпреки това, Вие трябва да го използвате внимателно, за да получите най-добър резултат.

Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

Консултирайте се с Вашия фармацевт, ако имате допълнително въпроси.

Ако симптомите на заболяването не се подобрят до 30 дни, трябва да се консултирате с лекар.

Bilobil® capsules 40 mg
Ginkgo bilobae folii extractum siccum
Билобил капсули 40 mg
сух екстракт от листа на гинко билоба
освежава паметта



Активно вещество: сух екстракт от гинко (Ginkgo bilobae folii extractum siccum).

Помощни вещества: лактоза монохидрат, силициев диоксид, безводен, царевично нишесте, магнезиев стеарат, талк.

капсулна обвивка: титаниев диоксид (E171), индиготин (E132), оцветител азорубин (E122), железен оксид червен (E172), железен оксид черен (E172), желатин.

*Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.*

1. КАКВО Е ВІЛОВІЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Състав

1 твърда капсула съдържа 40 mg сух екстракт от листа на гинко (Ginkgo bilobae folii extractum siccum) 35-67 : 1, стандартизирани, така, че 40 mg съдържат не по-малко от 9.6 mg ginkgo флавоноиди, калкулирани като флавонови гликозиди и 2.4 mg терпенови лактони (гинколиди, билобалиди).

Екстракционен разтворител: ацетон 60% (m/m).

Опаковка

Картонена кутия с 20 капсули в блистерна опаковка.

Картонена кутия с 60 капсули в блистерна опаковка.

Какво е Bilobil?

Капсулите Bilobil съдържат стандартизиран екстракт от листа на гинко, който подобрява снабдяването на мозъка с кислород и глюкоза. Активните съставки в този екстракт флавонови гликозиди, гинколидите и билобалидите разширяват кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението, предотвратяват слепването на тромбоцитите и, като регулират метаболизма, предпазват клетките и тъканите от увреждане поради недостига на кислород. Екстрактът от гинко е ефикасен при нарушено кръвоснабдяване на мозъка и на крайниците.

Капсулите Bilobil подобряват кръвоснабдяването на мозъка и метаболизма и поради това предотвратяват отслабването на интелектуалните способности. При нарушено кръвоснабдяване на крайниците, те смекчават усещането за студ, бодежи, жъланост и болка при ходене.





За какво се използва Vilobil?

Капсулите Vilobil се използват при възрастово обусловени нарушения на кръвообръщението и функционирането на мозъка (дементен синдром, включващ първична дегенеративна деменция, деменция при мозъчно-съдова болест или смесени форми), проявяващи се с:

- отслабване на паметта и на интелектуалните способности,
- неразположение и тревожност,
- световъртеж,
- шум в ушите (тинитус)
- главоболие и разстройство на съня.

При нарушено кръвоснабдяване на крайниците.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА УПОТРЕБЯВАТЕ VILOBIL

Кой не трябва да приема Vilobil?

Вие не трябва да приемате капсулите Vilobil при свръхчувствителност (алергия) към екстракт на гинко или някое от помощните вещества на лекарствения продукт.

Предпазни мерки и предупреждения

Капсулите Vilobil не се препоръчват при деца, защото няма показания екстракта на гинко да се използва при тях.

Да не се приема по-висока от препоръчаната доза.

Да се прилага с внимание при кръвоизливи (стомашно-чревни, вътречерепни, ретинални).

Приемане на Vilobil с храна и напитки

Вие можете да приемате капсулите Vilobil независимо от храненето. Няма данни за каквото и да било влияние на храна и напитки върху действието на гинко. Не е подходящо капсулите да се приемат с алкохолни напитки.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт.

Не се препоръчва на бременни жени и кърмачки да приемат Vilobil независимо, че не са наблюдавани увреждащи ефекти върху плода при изпитванията.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщения за този лекарствен продукт да влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Как други лекарствени продукти могат да взаимодействат с Vilobil?

Ако приемате други лекарствени продукти, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Капсулите Vilobil не се препоръчват, ако редовно приемате ацетилсалицилова киселина или лекарства, които предотвратяват коагулирането на кръвта.

Специални предупреждения за помощните вещества

Капсулите Vilobil съдържат азооцветителя азорубин (E122), който може да причини алергични реакции.

Капсулите Vilobil съдържат лактоза. Ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.



3. КАК ДА СЕ УПОТРЕБЯВА VİLOBİL?

Дозировка и начин на приложение

Възрастните трябва да приемат по 1 капсула три пъти дневно при:

- нарушения на кръвообръщението и функционирането на мозъка
- при световъртеж и шум в ушите
- при нарушение на кръвоснабдяването на крайниците

Капсулите се приемат несдъвкани с вода или друга течност. Можете да ги приемате независимо от храненето.

Първите признаци на подобрене обикновено се наблюдават след 1-месечно лечение. За по-дълготраен ефект се препоръчва лекарственият продукт да се приема поне в продължение на 3 месеца, особено от възрастни пациенти.

Ако имате впечатление, че ефекта от лекарствения продукт е твърде силен или твърде слаб, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете повече VİLOBİL отколкото би трябвало

Ако сте приели по-висока доза от лекарствения продукт отколкото би трябвало, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт незабавно.

Капсулите VİLOBİL са сигурно лекарство. Няма съобщения за интоксикация с екстракт на гинко.

Ако забравите да вземете VİLOBİL

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, VİLOBİL може също да прояви нежелани реакции.

В много редки случаи, употребата на капсулите може да доведе до по-леки стомашночревни нарушения, главоболие или реакции на свръхчувствителност на кожата (сърбеж, зачервяване, оток).

При поява на алергична реакция, спрете приемането на капсулите и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА VİLOBİL

Условия за съхранение

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от влага. Да се съхранява под 25°C.

Срок на годност

Да не се използва след срока на годност, отбеляван върху опаковката.

Информация за предписване

Продава се без лекарско предписание в аптеките и дрогерите.

Дата на последна корекция

16 Май 2005

