


ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА



Драги пациенти,
Моля прочетете тази листовка внимателно, за да получите информация какво трябва да съблюдавате при употребата на това лекарство. Ако имате въпроси се Обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

BRONCHICUM ELIXIR

БРОНХИКУМ ЕЛИКСИР

Състав

Лекарствени вещества

100 ml съдържат

Tinct. herbae Grindeliae (1:5) - 1ml ; Tinct. radix Primulae (1:5) - 0.5 ml;
Tinct. radix Pimpinellae (1:5) - 0.2 ml; Tinct. cortex Quebracho (1:5) - 0.7 ml
Tinct. herbae Thymi (1:5) - 1 ml.

Помощни вещества

Евкалиптово масло; ментол; захарен сироп; натриев бензоат; пречистена вода.

Предлагат се следните видове опаковки Бронхикум Еликсир :
Оригинални опаковки със 130 g (100 ml) .

Какво представлява Бронхикум Еликсир и в какви случаи се използва ?
Бронхикум Еликсир е лекарство от растителен произход, което се използва при кашлица, възпаление на бронхите и трудно отхрачване на секрета, бронхиални катарии.

Притежател на разрешението за употреба:

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D 65926 Frankfurt am Main /Germany,

Производител:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln /Germany, Телефон:
*49/221/509-01, Факс: *49/221/509-2711.

Какво трябва да имате предвид преди да приемете Бронхикум Еликсир S?

В какви случаи не трябва да използвате Бронхикум Еликсир ?

Лекарството не трябва да се приема при данни за свръхчувствителност (алергия) към мащерка, корен от примула или някоя от останалите съставки. Поради съдържанието на етанол в сиропа, той не трябва да се използва от алкохолици.



По същата причина, Бронхикум Еликсир трябва да се използва само след лекарска консултация в случай на чернодробни заболявания, епилепсия, мозъчни заболявания или мозъчни травми.

Ако след употребата на това лекарство не се повлияват симптомите или се влоши състоянието на болния, трябва да се преоцени лечението.

Бременност/кърмене

Както и с всички лекарствени средства, преди употреба се посъветвайте със своя лекар.

Специални предупреждения за употреба

При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание, че това лекарство съдържа захароза – 5 ml (1 чаена лъжичка) от сиропата отговарят на 0.34 ВЕ (хлебни единици) = 4 g глюкоза.

Бронхикум Еликсир съдържа 1.5 обемни % етанол.

Взаимодействия с други лекарства

Моля, уведомете своя лекар или фармацевт ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, дори и ако са такива, отпускани без рецепта.

Как трябва да се приема Бронхикум Еликсир ?

Приемайте Бронхикум Еликсир винаги точно по указанията в листовката. Моля, говорете с Вашия лекар или аптекар, когато не сте съвсем сигурни.

Бронхикум Еликсир трябва да се приема през деня на равномерно разпределени дози.

Ако не е предписано друго, възрастните приемат по 1 чаена лъжичка на всеки 2-3 часа до 6 пъти дневно, децата над 6 години според възрастта, 2-3 пъти дневно ½ до 1 чаена лъжичка.

Ако Вие сте изпили по-голямо количество от Бронхикум Еликсир, трябва да знаете, че не е необходимо да предприемате специални мерки. Отравяне с Бронхикум Еликсир се изключва. При деца при поглъщането на по-големи количества би могло да доведе до симптоми на алкохолно отравяне.

Ако сте пропуснали един прием продължете нататък по предписаната дозировка.

Какви нежелани реакции са възможни

Както всички лекарства и Бронхикум Еликсир S е възможно да предизвика нежелани реакции

При оценката на нежеланите лекарствени реакции са взети следните:

Много чести – повече от 1 на 10 пациента

Чести – повече от 1 на 100 пациента

Не чести – повече от 1 на 1000 пациента

Редки – повече от 1 на 10 000 пациента

Много редки – 1 или по-малко на 10 000 пациента

В много редки случаи стомашни смущения и гадене.

В отделни много редки случаи могат да се появят алергични кожни изменения като обрив, уртикария като подуване на лицето, в устата и/или ларинкса (едем на Квинке).



Моля, информирайте своя лекар или аптекар, когато забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в листовката.

Как се съхранява Бронхикум Еликсир

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Бронхикум Еликсир не трябва да се използва след изтичане срокът на годност, изписан върху опаковката.

След отваряне на опаковката е годен 12 седмици при стайна температура.

Забележка

При изливане леко удрайте върху дъното на стъклото.

Бронхикум Еликсир съдържа екстракт от растения; при поява на утайка по дъното на стъклото при дълго лагеруване тя не оказва влияние на действието му.

Да се разклаца преди употреба.

Указание за диабетици

При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание, че това лекарство съдържа захароза - 1 чаена лъжичка (5 мл) отговаря 0,34 ВЕ (хлебни единици) = 4g глюкоза .

Дата на последна актуализация
Юни 2004

