

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БРОНХО – ВАКСОМ За деца 3,5 mg твърди капсули
BRONCHO – VAXOM Children 3,5 mg hard capsules

bacterial lysates (бактериални лизати)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представляват капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца и за какво се използват
2. Преди да приемете капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца
3. Как да приемате капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАПСУЛИТЕ БРОНХО – ВАКСОМ ЗА ДЕЦА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

БРОНХО – ВАКСОМ За деца е лекарствен продукт по лекарско предписание. Продуктът е от биологичен произход и стимулира естествените защитни сили на организма.

БРОНХО – ВАКСОМ За деца е показан за:

- Имунотерапия.
- Профилактика на повтарящи се инфекции на дихателните пътища и инфекциозни обостряния на хроничните бронхити.
- Съпътстващо лечение на остри инфекции на дихателните пътища.

ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ КАПСУЛИТЕ БРОНХО – ВАКСОМ ЗА ДЕЦА

Ако Вашият лекар Ви предпише антибиотици, които да бъдат прилагани съвместно с капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца, не забравяйте да ги вземате.

Не приемайте капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца, ако имате свръхчувствителност към лекарственото вещество и/или към някое от помощните вещества.

Обърнете специално внимание при лечението с капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца:

Приемането на БРОНХО – ВАКСОМ За деца капсули не се препоръчва при деца под 6-месечна възраст поради незрялост на имунната им система.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт:

- ако страдате от друго заболяване;
- ако сте алергични;



- ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, вътрешно или външно, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Въпреки че, лекарственият продукт е предназначен за прием от деца, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Вашият лекар ще реши дали можете или не можете да приемате БРОНХО – ВАКСОМ За деца по време на бременност или кърмене.

Шофиране и работа с машини

Неприложимо, тъй като лекарственият продукт е предназначен за прием от деца.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАПСУЛИТЕ БРОНХО – ВАКСОМ ЗА ДЕЦА

Моля да спазвате дозата посочена в листовката или предписана от Вашия лекар. Ако смятате, че действието на лекарството е прекалено слабо или обратно прекалено силно, моля да потърсите за съвет Вашия лекар или фармацевт.

Деца на възраст от 6 месеца до 12 години:

Профилактика:

1 капсула дневно на гладно, 10 последователни дни в месеца, за 3 месеца.

Лечение през остриите стадии:

1 капсула дневно на гладно, до изчезване на симптомите, но в продължение на минимум 10 последователни дни. В случаите, когато е необходима антибиотична терапия, лечението с БРОНХО – ВАКСОМ За деца трябва да започне едновременно с прилагането на антибиотика.

Забележка: Ако за децата е трудно да преглътнат капсулата, е по-добре да бъдат избрани като форма сашетите, тъй като са по-подходящи за тези пациенти.

Не променяйте дозата по Ваше желание. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако смятате, че лекарството е твърде слабо, или обратно - твърде силно.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца могат да предизвикат нежелани ефекти като: стомашно-чревни смущения (коремни болки, гадене, диария, повръщане), кожни реакции (зачервявания, обрив и/или уртикария, сърбежи), главоболие, дихателни проблеми (усилване на кашлицата, затруднено дишане, астма), общи реакции (треска, усещане за отпадналост, алергична реакция).

Повечето от тези странични ефекти са временни.

В случай на продължителни стомашно-чревни и дихателни нарушения, веднага спрете лечението си и информирайте Вашия лекар или фармацевт.

При дълготрайни кожни реакции и дихателни проблеми, лечението трябва да се преустанови, тъй като могат да се развият алергични реакции.

БРОНХО – ВАКСОМ За деца може да предизвика редки кожни реакции, които може да бъдат и сериозни.

При поява на кожна реакция прекратете употребата на лекарството и уведомете незабавно Вашия лекар.



Ако забележите други странични ефекти, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт за появата им.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА КАПСУЛИТЕ БРОНХО – ВАКСОМ ЗА ДЕЦА

БРОНХО – ВАКСОМ За деца капсули трябва да се съхраняват на сухо място, защитено от топлина (под 25°C).

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Съхранявайте лекарствения продукт на място, недостъпно за деца.

Не използвайте капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца след изтичане на срока на годност, който е отбелязан върху блистера и върху картонената опаковка, след надписа “Годен до”.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

За повече информация, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържат капсулите БРОНХО – ВАКСОМ За деца

1 капсула БРОНХО – ВАКСОМ За деца съдържа 3,5 mg бактериални лизати от следните видове: *Haemophilus influenzae* (тип b), *Streptococcus pneumoniae* (тип 1, тип 2, тип 3 и тип 47), *Klebsiella pneumoniae*, subsp. *pneumoniae* (2 щам), *Klebsiella pneumoniae* subsp. *ozaenae*, *Staphylococcus aureus* (6 щам), *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus viridans* (3 щам), *Neisseria (Branhamella) catarrhalis* (3 щам).

Лекарственият продукт БРОНХО – ВАКСОМ За деца съдържа също и други съставки: модифицирана царевична скорбяла (прежелатинизирана), магнезиев стеарат, пропилгалат, глутамат, манитол, желатин, индиготин, титанов диоксид.

Какво съдържа опаковката

Опаковките съдържат 1 или 3 блистера по 10 капсули.

Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

OM Portuguesa
Rua da Industria No 2, Quinta Grande, 2720-302 Amadora
Португалия

Производител:

OM PHARMA
22, rue du Bois-du-Lan
1217 Meyrin 2/ Geneva
Швейцария

Дата на последно актуализиране на листовката: Юли 2007.

