

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Кафетин Колд/Caffetin Cold филмирани таблетки

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Кафетин Колд и за какво се използва
2. Преди да приемате Кафетин Колд
3. Как да приемате Кафетин Колд
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате Кафетин Колд
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2368 / 25.06.08
Одобрено: 8 / 20.11.07

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАФЕТИН КОЛД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Кафетин Колд/Caffetin Cold филмирани таблетки

Кафетин Колд е комбиниран лекарствен продукт, съдържащ няколко активни съставки. Парацетамол е болкоуспокояващо и понижаващо температурата средство. Псевдоефедрин намалява отока на носната лигавица и по този начин прави проходими носа и дихателните пътища. Декстрометорфан подтиска кашлицата като понижава дразненето в гърлото и бронхите. Витамин С усилва имунната система. Кафетин Колд облекчава симптомите на обикновената хрема и грипа (главоболие, болки в мускулите, болки в гърлото, запушен нос, висока температура и кашлица).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ КАФЕТИН КОЛД

Не приемайте Кафетин Колд

- Ако сте алергични към Кафетин Колд или към някое от останалите съставки на Кафетин Колд;
- Ако имате тежка хипертония, заболявания на коронарните артерии, тежки чернодробни или бъбречни увреждания;
- Ако в момента приемате или през предхождащите две седмици сте приемали лекарства или продукти от групата на MAO-инхибиторите.

Обърнете специално внимание при употребата на Кафетин Колд

- Ако имате лека до умерена хипертония, сърдечно заболяване, диабет, чернодробно или бъбречно заболяване, хиперфункция на щитовидната жлеза (хипертироидизъм), повишен



вътреочно налягане или увеличена простата. Попитайте Вашия фармацевт или лекар дали може да приемате Кафетин Колд.

- Ако сте над 60 години или организмът Ви е изтощен е по-вероятно да се проявят някои от нежеланите ефекти на медикамента.
- Не вземайте това лекарство преди да разговаряте със своя лекар или фармацевт, ако приемате повече от три алкохолни питиета дневно или ако имате чернодробно увреждане вследствие на употреба на алкохол.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не вземайте Кафетин Колд едновременно с други продукти, съдържащи парацетамол.

Кафетин Колд, приеман едновременно с лекарства за лечение на депресия, може да повиши кръвното налягане и сърдечната честота. Приет с халоперидол може да доведе до безпокойство, раздразнителност и нарушения в съня.

Ефектът на Кафетин Колд може да се понижи от някои медикаменти за лечение на епилепсия.

Кафетин Колд може да усилва ефекта на оралните антикоагуланти (варфарин) и на хлорамфеникол (антибиотик).

Кафетин Колд може да намали ефекта на някои медикаменти за лечение на високо кръвно налягане.

Прием на Кафетин Колд с храни и напитки

Таблетките Кафетин Колд могат да се приемат независимо от храната.

Избягвайте употребата на алкохол. Това лекарство, прието с алкохол, може да предизвика чернодробно увреждане.

Избягвайте едновременния прием с храни, съдържащи кофеин, защото може да предизвикат раздразнителност и сърцебиене.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Вашият фармацевт или лекар ще Ви обяснят потенциалната полза и риск при прием на Кафетин Колд по време на бременност или кърмене.

Шофиране и работа с машини

Бъдете внимателни, ако шофирате или работите с машини, докато не установите какъв е ефектът на лекарството върху Вас. Кафетин Колд може да предизвика замаяност при някои хора.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАФЕТИН КОЛД

Винаги приемайте Кафетин Колд, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза на Кафетин Колд за възрастни и деца над 12 години е една таблетка три пъти дневно. Могат да се приемат две таблетки наведнъж. Интервалът между приемите да бъде не по-къс от четири часа. Максималната еднократна доза е две таблетки, а максималната дневна доза е по две таблетки четири пъти дневно (8 таблетки за 24 часа).



Не вземайте Кафетин Колд повече от 5 последователни дни. Ако симптомите Ви не се облекчават или се влошат, консултирайте се с Вашия лекар.

Не се препоръчва употребата на Кафетин Колд при деца под 12 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кафетин Колд

Ако сте погълнали по-голяма от препоръчаната доза, трябва веднага да се свържете с Вашия лекар или фармацевт дори да се чувствате добре, поради риск от забавено сериозно чернодробно увреждане.

Ако сте пропуснали да приемете Кафетин Колд

Приемът на Кафетин Колд може да продължи в зависимост от степента на облекчение на симптомите. Не вземайте двойна доза, надвишаваща максималната еднократна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Кафетин Колд може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Рядко могат да възникнат следните нежелани реакции: гадене, повръщане, диария, сънливост, безпокойство, раздразнителност, замаяност, нарушения в съня, повишено кръвно налягане и сърцебиене, сухота в устата, главоболие; изключително рядко: покачване на чернодробните ензими, панкреатит, промени в кръвната картина.

Всички лекарства могат да предизвикат алергични реакции. Сериозни алергични реакции са много редки и изключително рядко са животозастрашаващи. Всяко внезапно хриптене, затруднение в дишането, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж (особено засягащи цялото тяло) трябва да Ви накарат да се консултирате веднага с лекар. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАФЕТИН КОЛД

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Кафетин Колд след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху блистера след "EXP". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изваждайте таблетките от блистера предварително.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Какво съдържа Кафетин Колд

- Активните вещества са: парацетамол, псевдофедрин, декстрометорфан и аскорбинова киселина (витамин С);

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg парацетамол, 30 mg псевдофедрин хидрохлорид, 15 mg декстрометорфан хидробромид и 60 mg аскорбинова киселина.

- Другите съставки са:

Таблетно ядро

Микрокристална целулоза; силиций, колоиден анхидрид; натриева кроскармелоза; талк; магнезиев стеарат.

Покритие на таблетката

Opadry II blue: Поливинилов алкохол-частично хидролизиран, титанов диоксид (E 171), талк, макрогол, FD&C син/индигокармин (E 132).

Как изглежда Кафетин Колд и какво съдържа опаковката

Кафетин Колд са сини, продълговати, двойноизпъкнали филмирани таблетки с разделителна линия от едната страна.

Кафетин Колд таблетки са пакетирани в блистер (алуминиево фолио/PVC/TE/PVdC фолио), съдържащ 10 таблетки.

Картонената кутия съдържа 10 таблетки (1 блистер) и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

"Алкалоид" ЕООД,
ж.к. "Мотописта" 2,
ул."Рикардо Вакарини" № 2, ет.3, ап.10
гр.София 1404, Р. България
tel. +359 2 80 81 081
fax. +359 2 95 89 367
e-mail: office@alkaloid.bg

Производител

АЛКАЛОИД АД - Скопие
бул."Александър Македонски" 12
1000 Скопие, Република Македония
тел: +389 2 31 04 000
факс: +389 2 31 04 021

Производител, отговорен за освобождаване на партидата

ALKALOID d.o.o. Ljubljana
Celovška 40 a
1000 Ljubljana
Р. Словения

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката

