

## Листовка за пациента

### Calpol 6+ 250mg/5ml oral suspension Калпол 6+ 250mg/5ml перорална суспензия

парацетамол (paracetamol)

ИЗПЪЛНИ ЕЛЪН
Листовка - Приложение 2
КЪМ РУ №: 11-4585, 31.03.09
20/08.07.08

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа **важна за Вас информация**. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че симптомите се влошават или не се подобряват.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### В тази листовка:

1. Какво представлява Калпол 6+ и за какво се използва
2. Преди детето Ви да приеме Калпол 6+
3. Как се приема Калпол 6+
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Калпол 6+
6. Допълнителна информация

#### 1. Какво представлява Калпол 6+ и за какво се използва

Калпол 6+ се използва за облекчаване на леки до умерени болки, включително главоболие, невралгия, зъбобол, болки при никнене на зъбите, възпалено гърло, грип. Калпол 6+ се прилага и за понижаване на телесната температура при треска. Консултирайте се с лекар при силни болки, много висока температура или ако Ви се струва, че лекарството не облекчава оплакванията.

#### 2. Преди детето Ви да приеме Калпол 6+

Консултирайте се с лекар преди детето Ви да започне приема на лекарството, в случай че отговорите с "да" на някой от следните въпроси:

- Детето Ви алергично ли е към Калпол 6+, парацетамол или към някое от помощните вещества в лекарството?
- Детето Ви има ли вродена непоносимост към фруктоза?
- Детето Ви има ли заболяване на бъбреците или черния дроб?

Не давайте на детето си други лекарства, съдържащи парацетамол, докато то приема Калпол 6+. Калпол 6+ може да се прилага едновременно с лекарства за лечение на епилепсия, но трябва да се има предвид, че в този случай Калпол 6+ може да не повлияе достатъчно болката или температурата. Едновременният прием на някои лекарства за лечение на депресия, успокоителни, лекарства за епилепсия, както и големи количества алкохол, увеличава вероятността от поява на нежелани лекарствени реакции, предизвикани от парацетамол. Ако не сте сигурни дали може да използвате Калпол 6+ заедно с друго лекарство, непременно потърсете съвета на лекар.

#### 3. Как се приема Калпол 6+

Преди прием използвайте мерителната лъжичка, поставена в опаковката, за да измерите необходимата доза. Мерителната лъжичка има две части. По-голямата, напълнена догоре, съдържа 5 ml суспензия, което отговаря на 250 mg от активното вещество парацетамол. По-малката, напълнена догоре, съдържа 2,5 ml суспензия, което отговаря на 125 mg парацетамол.



## Листовка за пациента

- Обичайната дозировка на Калпол 6+ е:

Възраст	Дозировка
Деца от 1 до 6 години	По 1 - 2 малки лъжички (2,5-5 ml) т.е. 125-250 mg парацетамол, 4 пъти дневно
Деца от 6 до 12 години	По 1 - 2 големи лъжички (5-10 ml) т.е. 250-500 mg парацетамол, 4 пъти дневно
Възрастни и деца над 12 години	По 2 - 4 големи лъжички (10-20 ml) т.е. 500-1000 mg парацетамол, 4 пъти дневно.

- Преди употреба разклатете добре бутилката.
- За да отворите бутилката, натиснете капачката надолу и завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Ако болката или температурата продължат може да се дава повторна доза на всеки 4-6 часа.
- Да не се приемат повече от 4 дози на ден.
- Ако болката и високата температура продължават, се консултирайте с лекар и не прилагайте Калпол 6+ повече от 3 дни.

### Допълнителна информация за дозиране:

Дозировката в mg активно вещество (парацетамол) на kg телесно тегло при деца от 3 месеца до 12 години е 10-15 mg/kg на 4-6 часа, но не повече от 4 дози за 24 часа.

### **Ако детето е приело повече от необходимата доза Калпол 6+**

Ако детето е погълнало по-голяма еднократна доза или твърде много лекарство за един ден, дори да се чувства добре, уведомете лекар незабавно или се обадете на Бърза помощ. В случай на предозиране е много важно да потърсите незабавно съвет от лекар, тъй като дори детето да изглежда добре има риск от късно чернодробно увреждане.

### **Ако детето е пропуснало да приеме Калпол 6+**

Ако детето Ви е пропуснало прием, не се безпокойте. Дайте му следващата доза, ако е необходимо. Не забравяйте, не трябва да му давате повече от четири дози на ден.

### **4. Възможни нежелани реакции**

В повечето случаи Калпол 6+ не предизвиква нежелани лекарствени реакции.

Както всички лекарства, при някои пациенти Калпол 6+ може да причини такива реакции.

Ако при Вашето дете се появи някой от следните симптоми скоро след приема на Калпол 6+, СПРЕТЕ незабавно да давате лекарството на детето и уведомете лекар.

- Кожни обриви или други алергични реакции.
- Необичайна умора.
- Неочаквана поява на "синини" или кървене.
- Детето се разболява по-често (включително настинки) от обичайното.

Калпол 6+ съдържа глицерол. При високи дози тази съставка може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

Информирайте лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка или ако има нещо, което Ви тревожи, смущава или не разбирате.

При пациенти, които приемат лекарства, съдържащи парацетамол за повече от два месеца, могат да се проявят повече нежелани реакции. Тези реакции включват чернодробно и/или бъбречно увреждане. При пациентите, които приемат лекарството в препоръчаните дози и за кратки периоди от време, подобни реакции не се проявяват.

### **5. Как да съхранявате Калпол 6+**

- Съхранявайте Калпол 6+ при температура под 25°C, на място, защитено от нагряване и пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.



- Калпол 6+ трябва да се съхранява в оригиналната опаковка.  
Не използвайте Калпол 6+ след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

**6. Допълнителна информация**

**Какво съдържа Калпол 6+**

Активното вещество е парацетамол. Всеки 5 ml Калпол 6+ съдържат 250 mg парацетамол.  
Другите съставки са: сироп, разтвор на сорбитол, глицерол, дисперсна целулоза, полисорбат 80, захарна и портокалова есенция, метилхидроксibenзоат, жълт оцветител E110 и пречистена вода.

**Как изглежда Калпол 6+ и какво съдържа опаковката**

Суспензията е с жълто-оранжев цвят и има аромат на портокал. Калпол 6+ се предлага в картонена кутия с една бутилка от тъмно стъкло. Всяка бутилка съдържа 100 ml перорална суспензия. В опаковката е поставена мерителна лъжичка с два края за измерване на необходимата доза. Големият край представлява 5 милилитрова, а малкият - 2,5 милилитрова лъжичка.

**Производител:** Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Германия или  
The Wellcome Foundation Ltd., T/A Glaxo Wellcome Operations, Dartford, Kent DA1 5AH, Великобритания.

**Притежател на разрешението за употреба:** Glaxo Group Ltd., Greenford road, Greenford, Middlesex,  
UB6 0NN Великобритания.

**Дата на последно одобрение на листовката:**

Calpol 6+ (Калпол 6+) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

