

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2335-8, 24.06.01
Одобрено: 17 / 13.05.08

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА 3,125
КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА 6,25
КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА 12,5
КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА 25

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

В тази листовка ще намерите:

1. Какво представлява **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** и за какво се използва
2. Преди да приемете **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** таблетки
3. Как да приемате **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** таблетки
6. Допълнителна информация

Името на Вашето лекарство е **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** таблетки. Има четири вида таблетки според количеството на лекарственото вещество: 3,125 mg; 6,25 mg; 12,5 mg; 25mg.

СЪСТАВ

Всяка таблетка **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** 3,125 съдържа карведилол (carvedilol) 3,125 mg;
Всяка таблетка **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** 6,25 съдържа карведилол (carvedilol) 6,25 mg;
Всяка таблетка **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** 12,5 съдържа карведилол (carvedilol) 12,5 mg;
Всяка таблетка **КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА** 25 съдържа карведилол (carvedilol) 25 mg.

Помощни вещества: лактоза, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, нишесте, жълт железен оксид, колоидален силициев диоксид, талк, магнезиев стеарат.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

МЕДИКА АД

Бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82

София 1504

Телефон: 9600330

E-mail: sofia@medica.bg

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Индуриална зона

Сандански 2800

Телефон: 0746/34220

E-mail: info@medica.bg



Какво представлява Вашето лекарство и за какво се използва?

КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА е адренергичен блокер с множество действие, което се характеризира с блокиране на алфа и бета адренорецепторите. Чрез своето бета блокиращо действие, намалява артериалното налягане, сърдечната честота и сърдечния дебит. Като блокира алфа рецепторите разширява периферните съдове и намалява периферното съпротивление. При пациенти със сърдечна недостатъчност подобрява помпената функция на сърцето, като увеличава фракцията на изтласкване на лявата камера. КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА се прилага за лечение на: лека, средна и тежка форма на сърдечна недостатъчност, високо кръвно налягане и стенокардия (гръдна жаба).

Преди да започнете да използвате КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА

Не трябва да приемате КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА в следните случаи:
Влошена сърдечна недостатъчност с подчертана задръжка на течности, което налага венозно инжектиране на лекарства, подпомагащи работата на сърцето.

Нарушено провеждане на импулсите на сърцето (сърдечен блок II и III степен)

Синдром на болния синусов възел, което се изразява в намаляване на сърдечната честота.

Тежка хипотония (систолично налягане под 85 mm Hg)

Тежка брадикардия (сърдечна честота под 50 удара в минута)

Астма и обструктивни заболявания на дихателните пътища

Чернодробна недостатъчност


Свръхчувствителност към карведилол или някое от помощните вещества.

Преди да започнете лечението с КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА, информирайте Вашия лекар ако страдате от:

- забавен пулс
- ангина на Принцметал
- проблеми с черния дроб, бъбреците или щитовидната жлеза
- диабет
- феохромоцитом (тумор на надбъбречната жлеза, причиняващ високо кръвно налягане)
- кожното заболяване псориазис
- нарушено кръвообръщение (заболяване на Рейно)
- взимате лекарства за обезводняване (диуретици), калциеви антагонисти (дилтиазем), клонидин, дигоксин
- взимате лекарството симетидин за лечение на язва
- взимате лекарството рифампицин за лечение на туберкулоза
- взимате инхибитори на моноаминооксидазата за лечение на депресия
- взимате лекарството клонидин за лечение на мигрена
- провеждате десенсибилизираща терапия за алергия
- носите контактни лещи.

Употреба при деца

КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА не се прилага при деца под 18 години



Ако сте бременна или кърмете

Ако сте бременна не трябва да приемате КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА. Лекарството се отделя с кърмата затова не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Ако шофирате или работите с машини

Ако по време на лечението чувствате умора или замаяност не трябва да шофирате или работите с машини. Трябва да избягвате употребата на алкохол, тъй като това може да влоши подобни оплаквания.

Как да приемате КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА таблетки?

Лечението се провежда по начин, указан от лекуващия Ви лекар. Взимайте таблетките с малко вода без да ги сдъвквате.

Сърдечна недостатъчност

Таблетките се взимат два пъти дневно – сутрин и вечер. Лечението започва с много ниска доза, като лекарят Ви постепенно увеличава дозата, докато достигнете до тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.

При лечение на сърдечна недостатъчност се препоръчва терапията с карведилол да започне от специалист при болнични условия.

В някои случаи при лечение на сърдечна недостатъчност може състоянието на болния да се влоши в начало на лечението. Симптомите умора и задух, заедно с прояви на задръжка на течности могат да се задълбочат. В такива случаи, трябва да информирате лекуващия Ви лекар, тъй като може да се наложи промяна в дозата на другите лекарства, които приемате или на КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА.

Едновременно с КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА трябва да продължите лечението и с останалите лекарства за сърдечна недостатъчност, предписани Ви от лекаря.

Високо кръвно налягане

Обичайната доза е една или две таблетки дневно. Ако не сте взимали КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА преди това, трябва да започнете с таблетки от 3,125 mg. Дозата се увеличава постепенно по указания на лекуващия лекар.

Стенокардия

Обичайната доза е една таблетка два пъти дневно, но лекуващият лекар може да Ви предпише повече или по-малко таблетки.

Ако Ви предстои хирургична интервенция и се налага анестезия трябва да съобщите, че провеждате лечение с карведилол.

Прекратяване на лечението

Не прекратявайте рязко лечението с КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА, преди да се консултирате с лекар. Ако внезапно прекратите лечението, може да се наблюдават нежелани реакции. Лекарят ще Ви инструктира как постепенно да намалите дозата до пълното прекъсване приема на лекарството.

Може ли да се приема едновременно с други продукти?

Информирайте Вашия лекар за всички медикаменти, които вземате или възнамерявате да използвате, включително тези, отпускани без рецепта. Особено е важно Вашия лекар да знае, ако Вие приемате други лекарства за понижаване на кръвното налягане (дилтиазем, верапамил, диуретици); дигоксин, клонидин, рифампицин, симетидин, циклоспорин, инсулин.

Необходимо е внимание по време на обща анестезия, поради взаимно усилване на потискащия ефект на карведилол и анестетиците върху сърдечната дейност и кръвното налягане.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Карведилол медика?

КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА се понася добре, но при някои болни може да предизвика нежелани реакции.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Редки са появата на обрив и сърбеж. При поява на задух незабавно информирайте вашия лекар.

Нарушения на нервната система:

може да се появят замаяване, главоболие, умора, промяна в съня, мравучкане и болки в крайниците.

Стомашночревни нарушения: може да се наблюдава гадене, повръщане, диария или запек.

Сърдечни нарушения: забавяне на пулса, понижаване на кръвното налягане при промяна положението на тялото, студени крайници, оток на крайниците.

Нарушения в дихателната система:

Рядко може да се наблюдава задух, симптоми на астма.

Може да се повиши телесното тегло, а при някои болни със сърдечна недостатъчност леко се повишават стойностите на холестерол в кръвта.

Някои индивиди се оплакват от болка в гърдите, грипоподобни симптоми, нарушено зрение, сухота в очите или устата, засилено изпотяване, промяна в чернодробните проби, промени в кръвните изследвания, промяна в честотата на уринирането.

При мъже има редки съобщения за затруднена ерекция.

Рядко може да се развие временна бъбречна недостатъчност, при която се намалява отделянето на урина.

Ако забележите поява на някой от изброените симптоми или на други, неописани в листовката, информирайте Вашия лекар.

Ако имате диабет, в началото на лечението с КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА може да се проследява по-често нивото на глюкозата в кръвта, тъй като лекарството може да маскира ранните признаци на ниски стойности на кръвната захар.

Какво да правите при предозиране?

Ако вземете повече таблетки, може да получите световъртеж, слабост, задух, силно изразена отпадналост. Незабавно информирайте Вашия

лекар или се свържете незабавно с най-близкото отделение за спешна медицинска помощ.

Как трябва да съхранявате Вашето лекарство?

Таблетките трябва да се съхраняват при температура под 30°C, на сухо място. Пазете блистерите в картонената опаковка, за да ги предпазите от светлина.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца !

Срок на годност:

Три години

Не използвайте КАРВЕДИЛОЛ МЕДИКА след датата на изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Данни за опаковката:

Таблетки по 10 броя в блистер от PVC/ алуминиево фолио в картонени кутии по 3 блистера в опаковка.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно този продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя за разрешението за употреба:

Ралица Савова Тишкова

Пл. "Папа Йоан Павел II" №1

Тел. 9600353

Дата на последната редакция на текста

20.05.2008

