

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Casodex® 150 mg film-coated tablets
(bicalutamide)

Казодекс 150 mg филмирани таблетки
(бикалутамид)

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА КАЗОДЕКС 150 mg

Информацията в тази листовка се отнася само за вашето лекарство Казодекс 150 mg. Моля прочетете я внимателно. Тя ви дава важна информация, но не може да ви даде отговор на всеки въпрос. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте лекуващия си лекар или фармацевта.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО?

Казодекс 150 mg се произвежда във вид на филмирани таблетки и всяка таблетка съдържа 150 mg бикалутамид (bicalutamide).

Всяка таблетка съдържа няколко неактивни съставки, които спомагат за произвеждането ѝ. Те са лактоза, натриев нишестен гликолат, повидон, магнезиев стеарат, хипромелоза, макрогол 300 и титанов диоксид.

Казодекс 150 mg се произвежда в блистерни опаковки от 28 таблетки.

Казодекс 150 mg спада към групата лекарствени продукти наречени антиандрогени. Това означава, че той възпрепятства някои действия на андрогените (мъжки полови хормони) в организма.

КОЙ Е ПРОИЗВЕЛ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Притежателят на разрешението за употреба на Казодекс 150 mg е:
AstraZeneca UK Limited, 600 Capability Green, LU1 3LU, Luton, Великобритания

Производител:

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire SK 10 4TG, Великобритания и
AstraZeneca GmbH, Otto-Hahn-Strasse, D-68723 Plankstadt, Германия

ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Казодекс 150 mg се употребява за лечение на рак на простатата

В ранните стадии се използва като незабавно или първоначално лечение.

Казодекс 150 mg се употребява за самостоятелно лечение на рак на простатата при пациенти, за които кастрацията или друго медикаментозно лечение не е подходящо или приемливо.



КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА КАЗОДЕКС 150 mg

- Казодекс 150 mg не трябва да се употребява ако сте имали алергична реакция към Казодекс 150 mg, Казодекс 50 mg или към някое от помощните вещества.
- Казодекс 150 mg не трябва да се приема от жени, включително бременни жени или майки, които кърмят.
- Казодекс 150 mg не трябва да се дава на деца.
- Таблетките са само за вас и не трябва никога да се дават на друг.

КАКВИ ПРЕДПАЗИН МЕРКИ ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С КАЗОДЕКС 150 mg

Преди да вземете лекарството, кажете на лекуващия лекар, ако:

- Страдате от някакво нарушение или заболяване, което засяга черния дроб;
- Вземате някакви други лекарства, включително тези, които вие сами сте си купили, особено ако приемате перорални антикоагуланти (за предпазване от образуване на кръвни съсиреци), някои антихистаминови (терфенадин или астемизол), цисаприд (за някои нарушения в храносмилането) или циклоспорин (за потискане на имунната ви система).
- Както бе споменато по-рано всяка таблетка съдържа 183 mg лактозен монохидрат, който може да причини проблем в малък брой пациенти чувствителни към лактоза
- Малко вероятно е вашите таблетки да се отразят неблагоприятно на способността ви да шофирате или да работите с машини.
- Ако постъпите в болница предупредете медицинския персонал, че вземате Казодекс.
- Преустановете приемането на таблетките, само когато лекуващия лекар ви каже.

КАК ТРЯБВА ДА ПРИЕМАМ МОЯ КАЗОДЕКС 150 mg

- Следвайте указанията на лекуващия лекар относно това кога и как да вземате вашите таблетки. Моля **ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА** на опаковката. Попитайте лекуващия си лекар или фармацевта, ако не сте сигурни в нещо.
- Обичайната доза за възрастни е една таблетка дневно.
- Погълнете таблетката цяла с някаква напитка или вода.
- Постарайте се да вземате вашата таблетка по едно и също време всеки ден.



- Трябва да вземате Казодекс 150 mg, както ви е предписано. Ако пропуснете една доза обаче, не вземайте допълнителна доза; просто продължете с обичайния график.
- Ако вземете повече от обичайната си доза, обърнете се към лекуващия лекар или най-близката болница.
- Не спирайте приема на таблетките, дори когато се чувствате добре, освен ако лекуващият лекар не ви каже.

КАКВИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПИТАТЕ С КАЗОДЕКС 150 mg

Както при всички лекарства, така и по време на лечението с Казодекс 150 mg, понякога е възможно да изпитате нежелани реакции. Свържете се незабавно с Вашия лекар ако изпитате някой от следните нежелани реакции:

Нечести нежелани реакции

- сериозен задух или внезапно влошаване на наличен такъв, възможно е наличие на треска или кашлица. Някои пациенти вземащи Казодекс 150 mg развиват белодробно възпаление наречено интерстициална белодробна болест.
- силен сърбеж на кожата (с уртикария) или оток на лицето, устни, език и/или на гърлото, което може да причини трудност при гълтането
- кръв в урината
- коремна болка
- пожълтяване на кожа и очи (жълтеница) Това може да са симптоми на нарушение на чернодробната функция
- проблеми в храносмилането
- депресия

Ако някой от следните нежелани реакции ви притесни осведомете лекаря си:

Много чести нежелани реакции:

- увеличени или болезнени гърди

Чести нежелани реакции:

- топли вълни
- гадене
- сърбеж
- суха кожа
- импотентност
- наддаване на тегло
- отпадналост
- понижени либидо и фертилност
- косопад или повторно израстване на коса

Понякога Казодекс 150 mg може да се свърже с промени в кръвта, поради което може да се наложи лекуващия лекар да направи някои кръвни изследвания.

Не се тревожете от този списък от възможни реакции. **Вие може да не ги изпитате.**



Ако забележите някоя нежелана реакция, неописана в тази листовка, моля информирайте лекаря или фармацевта си.

КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ КАЗОДЕКС 150 mg

- Трябва да съхранявате таблетките при температура под 30°C.
- Съхранявайте таблетките в опаковката, в която са закупени.
- Ако лекуващия лекар реши да прекрати вашето лечение, изхвърлете таблетките по подходящ начин.
- Не вземайте таблетките след изтичане на срока на годност отбелязан върху опаковката.
- Съхранявайте таблетките на безопасно място, където децата не могат да ги видят или стигнат. Вашите таблетки могат да им навредят.

Дата на последна редакция: февруари 2004

Казодекс е търговска марка, собственост на AstraZeneca group of companies

© AstraZeneca 2005-2006

