

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

**ADENOCOR® (Adenosine)**  
**Аденокор® (Аденозин)**

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към  
разрешение за употреба №

618 / 05.03.02

Тази листовка съдържа кратка информация за медикамента. При съмнение или при наличие на някакви въпроси се обърнете към Вашия лекар.

### Състав:

Активното вещество е аденозин.

Всеки флакон от 2 мл съдържа 6 мг аденозин.

Помощни вещества: изотоничен разтвор на натриев хлорид в стерилна вода за инжекции.

Аденокор® е стерилен разтвор за интравенозно приложение.

Аденокор® е антиаритмично лекарствено средство (медикамент, който възстановява нормалния сърдечен ритъм).

### ПРОИЗВОДИТЕЛ

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE  
1, rue de l'Abbaye  
76960 NOTRE DAME BONDEVILLE  
FRANCE

### ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

**SANOFI-SYNTHELABO FRANCE**  
*174, avenue de France*  
*75013 Paris*  
*France*

### ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Аденокор® ?

Аденокор® се използва за диагноза и възстановяване на сърдечния ритъм.

### ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Аденокор® не трябва да се прилага при:

- астма;
- състояния, които причиняват забавяне на пулса или нарушено съзнание;
- бременност;

Ако страдате от хроничен бронхит, задух или хриптене, информирайте Вашия лекар. При едновременната употребата с някои медикаменти, храна или напитки, ефекта на Аденокор® може да се промени.

Информирайте лекуващия Ви лекар, ако вземате:

- дипиридамола;
- теофилин или аминофилин, използвани при астма и бронхит;
- други медикаменти, които да въздействат върху сърдечния ритъм,

или сте употребявали чай, кола, кафе или какао, или сте вземали шоколад през последните 12 часа преди да започнете лечението с Аденокор®.

## **НАЧИН НА УПОТРЕБА**

Аденокор® се прилага интравенозно. Началната доза е 3 мг. Ако първата доза се окаже неефективна се прилага 6 мг. Ако няма ефект се прилага доза от 12 мг. По време на лечението с Аденокор® се осъществява наблюдаване на сърдечния ритъм.

## **НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, НАБЛЮДАВАНИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА**

По време на употреба могат да се наблюдават някои нежелани ефекти.

Вашия лекар трябва да бъде информиран за всяка появила се нежелана лекарствена реакция. Тези ефекти продължават няколко секунди или минути.

Обикновено се наблюдава зачервяване на лицето, задух, тежест в гърдите, гадене, замаяване. По рядко: дискомфорт, изпотяване, налпитации, хипервентилация, тежест в главата, безпокойство, неясно виждане, горещина, брадикардия, болки в ръцете, гърба, главата, врата, метален вкус.

## **СРОК НА ГОДНОСТ**

Да не се използва след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката.

## **СЪХРАНЕНИЕ**

Да не се съхранява в хладилник.

След отваряне на флакона и използване на определено количество от медикамента, остатъкът е непригоден за по-късна употреба.

## **ОПАКОВКА**

Една опаковка съдържа 6 флакона.

## **ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

Декември 1996 година